

QUE FAIRE AU JARDIN EN SEPTEMBRE ?

Les arbres, arbustes et arbrisseaux

En septembre, ne faites rien, ni taille, ni élagage, sauf des travaux de sécurisation (après un coup de vent, branches malades...).

Les arbustes à floraison printanières ne sont plus taillés afin d'avoir une floraison abondante en 2021. Ceux à floraison estivale sont taillés une fois déflorisés et ceci jusqu'en mars 2021. Les haies au carré sont encore taillées (charmille, troène, hêtre taillé...).

Broyés, les déchets de tailles servent de paillis ou de bois raméal fragmenté.

Attention, pas plus de 20% de déchets de résineux !



SPIREE DU JAPON

Et après ?

En automne, des choix devront être faits en sachant que la forme idéale et la plus simple à gérer est la forme naturelle. Les arbres n'ont subi aucune taille et se développent naturellement selon les caractéristiques de l'espèce ou de la variété.

D'année en année, l'arbre croît puis se développe (floraison et fructification). Les feuilles mortes sont les seuls déchets. Il est donc important de se préoccuper des caractéristiques de l'arbre et de ses besoins (espace, sol, exposition...).

« Quand un arbre doit être grand,
il doit être grand ! »

Les formes d'arbres

D'autres formes existent, de la plus simple à conduire à la plus contraignante et génératrice de déchets :

- **Formes libres** : les arbres gardent leurs caractéristiques naturelles, mais ils subissent quelques tailles non destructurantes pour les adapter aux contraintes du lieu.


Les branches basses sont par exemple coupées pour faciliter le passage de véhicules ou de personnes, ou encore pour installer un équipement. La taille doit être faite le plus tôt possible et au fur et à mesure des années.

- **Formes pseudolibres** : les arbres ont subi de par le passé soit une taille régulière architecturée, soit une taille drastique. Ensuite, ils sont conduits en forme libre pour un retour vers un esthétisme plus harmonieux.

Plusieurs années sont nécessaires pour passer d'une forme à l'autre. Attention, les arbres sont fragilisés par la pousse vigoureuse des nouvelles branches qui sont très lourdes.

- **Formes architecturées** : les arbres ont des formes artificielles (rideau, trogne...). Les travaux de formation sont annuels et demandent une certaine compétence.

Attention, ces formes engendrent beaucoup de déchets verts. Les élagages suivants sont annuels ou tous les 2 / 3 ans en fonction des espèces ou de la forme choisie. Les interventions sont souvent en hauteur donc dangereuses.



DIFFÉRENTES FORMES DE CONDUITE DES ARBRES

Un conifère ne se taille pas sauf si le choix s'est porté sur une haie au carré. L'if convient bien à la taille. Les autres conifères (thuyas...) ne sont pas adaptés sauf si des pesticides sont utilisés pour lutter contre les prédateurs et les maladies. Comme ces produits sont interdits, leur conduite en haie taillée est compliquée et vouée à l'échec !



IF - TAXUS BACCATA

En septembre, la taille des rosiers consiste à supprimer les rameaux morts ou malades. Les fleurs fanées sont coupées pour favoriser une floraison tardive si les températures sont clémentes en automne.

Comment faire ?

Les feuilles vraies des rosiers possèdent 5 ou 7 folioles. Plus on se rapproche des fleurs, plus les feuilles sont incomplètes en folioles (3 au lieu de 5 par exemple).

Il suffit alors de tailler au dessus de la première feuille vraie ou de la deuxième.

Les rosiers seront taillés en octobre/novembre : la taille de nettoyage. Vous couperez alors les branches malades ou mortes. Vous diminuerez aussi leur volume jusqu'à 50 %. La taille de finition sera prévue en mars l'année prochaine.



FEUILLE À 3 FOLIOLES SOUS DES FLEURS FANÉES DE ROSIER



1ÈRE FEUILLE VRAIE À 5 FOLIOLES SITUÉE PLUS BAS



TAILLER JUSTE AU-DESSUS DE LA FEUILLE VRAIE

Arbres fruitiers et petits fruits

C'est encore la bonne période pour la taille en vert des arbres fruitiers à noyaux ou à pépins et notamment celle des cerisiers conduits en basse, demie ou haute-tige.

Les récoltes de quetsches se poursuivent. Ces prunes sont des fruits de bouche et de conservation (conserves, confitures, fruits séchés, congélation...). Depuis plusieurs semaines, les variétés de pommes ou de poires honorent les desserts et les plats sucrés salés.

De nombreux fruits tombent prématurément suite à la canicule et aux attaques d'insectes (carpocapses...).

Les pêches de vigne terminent la période de récolte de ces fruits à noyaux. Elles ne se conservent qu'un à deux jours (confitures, conserves...).



En octobre, vous récolterez : les variétés tardives de pommes et de poires, coings, noisettes, châtaignes, nèfles...

Les fruits tombés sont épandus sur le potager ou déposés au pied des haies et ceci en mélange avec des feuilles mortes tombées prématurément à cause des phases de canicules. Durant l'automne, ils feront la joie des vers de terre, des oiseaux ou d'autres auxiliaires du jardinier.



Les ateliers de jus de pommes ouvrent : 10 kg de pommes donnent plus de 6 litres de jus. Les déchets de pressage sont mélangés avec des feuilles mortes, du foin ou de la paille ; ils sont mis en tas en long (andain). Ce compostage composé de déchets aux caractéristiques contraires (sec/mouillé, fin/grossier, azoté/carboné) engendre un compost de bonne qualité. Les vers de compost (vers épigés) adorent ce mélange.

Côté petits fruits, complétez les paillis avec les déchets verts du moment ; ainsi les stocks d'humus sont reconstitués et les apports d'eau sont valorisés.

Les cannes des framboisiers remontants ou non remontants ayant produit sont coupées à ras sans blesser les nouvelles.

Attention, les nouvelles cannes des framboisiers remontants vont produire jusqu'en décembre en fonction des variétés et des conditions climatiques. Celles des variétés non remontantes ne produiront qu'en juin l'année prochaine



Pour les pieds de cassis ou de groseilles, c'est le bon moment pour commencer la taille de ces petits fruits souvent conduits en touffe. Les branches doubles sont simplifiées. La taille des jeunes rameaux en surnombre (bois clair) se fait en novembre car ce déchet de « luxe » peut être bouturé.


Pour en savoir + sur la taille et la plantation des arbres fruitiers et des petits fruits : ["Dossier plantation et taille des arbres fruitiers et des petits fruits" sur la page du Club.](#)

Au potager

Comme cela vous était présenté depuis plusieurs années par Eric CHARTON, nous vous proposons d'organiser votre potager en 4 grands espaces thématiques. Le choix des légumes ou des légumes-fruits suit une logique gastronomique, tout en alliant le compagnonnage entre les différentes espèces cultivées.

- **L'espace "Ratatouille"** : tomates, poivrons, aubergines, courgettes, piments, plantes aromatiques, ail, oignons et échalotes.
- **L'espace "Potée"** : carottes, poireaux, céleris, panais, navets, choux, concombres, cornichons, crosnes et topinambours pour donner du volume.
- **L'espace "Plat gros volumes"** : pommes de terre, haricots verts nains et à rames, petits pois nains et à rames et fèves.
- **L'espace "Soupe de courges"** : toute la famille des Cucurbitacées sauf courgettes et concombres.
- Les salades, les radis, les blettes, les betteraves de différentes couleurs ou les navets ... occupent les parties libres ou libérées des différents espaces.

Chaque année, vous déplacerez chacune de vos planches sur la planche suivante de gauche à droite : par exemple, l'espace "Plats gros volumes" prendra la place de l'espace "Ratatouille" en année N+1 etc.



Légende : Cultures en place (bleu foncé) | Travaux du mois (rouge) | Zones en paillis (vert)

PLAN D'IMPLANTATION DU POTAGER - ERIC CHARTON

Espace "Plats gros volumes"

- Laissez les pommes de terre en terre sauf besoin ou fortes attaques de mildiou.

- Cisaillez sur place les pieds de haricots ayant produit en laissant les racines dans le sol. Des plants de salades sont ensuite repiqués. Les haricots verts nains semés en août produiront jusqu'en octobre. Attention, vous pouvez laisser les haricots en place pour une récolte de graines pour un semis l'année prochaine.



Pour occuper les plates-bandes vides, repiquez les salades tous les 30 cm et dans un sol bien décompacté. Semez la mâche en ligne.

Après le semis, plombez (tassez) le sol avec une planchette ou le dessus d'un râteau.

Quelques conseils pour protéger l'espace "Plat gros volume" !

- Étalez les fanes de pomme de terre malades dans un espace éloigné du potager ou déposez les au compost en mélange avec des tontes de gazon.

Espace "Ratatouille"

- L'ail, l'oignon et l'échalote récoltés en juillet/août séchent à l'air libre dans des cagettes ou pendus en tresses.

- Les tomates ont parfois des feuilles "douteuses ou jaunies" : enlevez les rapidement.

D'année en année, la tonnelle reste quand même le système "presque" idéal de conduite des tomates : bonne aération, diminution du différentiel thermique entre le jour et la nuit, protection contre les pluies qui empêche le feuillage d'être mouillé en continu.

Certains d'entre vous ont enlevé les gourmands, d'autres non et d'autres encore ont fait un mix entre les 2 selon la vigueur des variétés.

Début août, il était conseillé de stopper la croissance des pieds bien développés en pinçant chaque rameau après la première feuille suivant la dernière inflorescence.

A partir du 15 août, vous avez laissé faire pour favoriser les productions automnales. Aujourd'hui, les pieds produisent de nouveau.



- Les pieds d'aubergines et de poivrons sont palissés pour éviter la casse des rameaux qui sont très fragiles.

- Les premiers pieds de courgettes produisent encore. Les nouveaux semés en juin/juillet prennent la relève.



- Les paillis de ces légumes-fruits sont complétés. La paille nouvellement récoltée a aussi son intérêt. N'oubliez pas que le déchet du moment est toujours le meilleur.

Espace "Potée"

- Les feuilles de la base des céleris-raves ou à branches sont arrachées puis sont déposées sur place ou au pied des poireaux. Cette technique favorise le grossissement des raves.

- Les poireaux grossissent grâce aux pluies de fin août. Attention, les risques d'attaques des mouches du poireau sont importants.

Certains jardiniers préfèrent les arracher fin septembre et les conserver préparés au congélateur (le vert et le blanc sont séparés).

- Les carottes, les choux et les panais sont récoltés à besoin. Les fanes sont laissées sur place.

Les concombres lisses ou épineux produisent encore, surtout les nouveaux pieds repiqués en juillet. Les feuilles peuvent être couvertes de blanc (oïdium) ; elles sont alors arrachées.

- En septembre, les espaces libres ou libérés sont semés d'engrais verts ou de mâche ou encore repiqués de chicorées (notamment de salades dites amères). Sinon, ils sont couverts de paillis.

Espace "Soupe de courges"

- Les différentes espèces de courges sont récoltées et conservées dans un endroit sec et hors gel (température entre 10 et 15 °C) ou dans un bureau. Les pieds sont laissés sur place, cisailés ou pas ; c'est selon vos envies !



Cultivez vos légumes, pas les moustiques !

Tous les moustiques piquent ?

Ce n'est pas une légende ! Seuls les moustiques femelles piquent. Le sang prélevé sur un hôte est nécessaire à la maturation des œufs grâce aux protéines qui le composent.

Après nous avoir piqué, les œufs vont pouvoir se développer puis la femelle moustique va chercher de l'eau stagnante pour y pondre une centaine d'œufs. Les moustiques mâles se nourrissent uniquement de sucs végétaux.

Pourquoi les piqûres de moustiques démangent-elles ?

Lorsque les femelles moustiques nous piquent, elles nous injectent un peu de leur salive qui contient un anticoagulant. Cette substance va permettre de fluidifier le sang.

En réponse à cette injection de salive, notre corps va produire un composé chimique, de l'histamine, qui est responsable de la sensation de démangeaison.



MOUSTIQUE TIGRE FEMELLE